
Obvestila za VINOGRADNIŠTVO



Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@gov.si

ISSN

št. 02.

Datum: 23. april 2021

VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta odganja. Pri razvoju opazimo stanja od nabrekanja brstov in pokanja lusk, do brstov v stadiju volne in ponekod do opaznih konic zelenih poganjkov (03-07 po lestvici BBCH). Precej brstov je poškodovala pozeba in v tem primeru bo treba počakati na razvoj sekundarnih brstov.

Ob neenakomernem brstenju utegnejo do izraza priti škodljive vrste pršic, katere v toplih dneh, s temperaturami nad 15 °C zavirate z rabo žveplovih pripravkov: **THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, MICROTHIOL DISPERS, PEPELIN WG, VINDEK 80 WG**. Navedeni pripravki v odmerku 3 do 8 kg/ha zmanjšajo stopnjo napada *pršic trsne kodravosti (akarinoze)*, *trsne pršice (erinoze)*, učinkujejo na zmanjševanje okužb *črne pegavosti vinske trte* in delujejo proti *oidiju vinske trte*. Proti navedenim škodljivim organizmom pride na stopnji še zaprtih brstov v poštev tudi pripravek **RED FOX** (kombinacija parafinskega olja in bakrovega oksida; odmerek 15 l/ha), ki je predviden za varstvo pred *rdečo sadno pršico* ali *gabrovo pršico* ter zmanjšuje še *črno pegavost vinske trte* (v odmerku 25 – 30 l/ha).

Zatiranje fitofagnih pršic je pomembno tudi iz vidika preprečevanja širjenja virusnih obolenj kot je npr. *Grapevine Pinot gris virus (GPGV)*.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

