

Obvestilo za SADJARSTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@kgzs-zavodnm.si

ISSN

št. 10

Datum: 07. maj 2021

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

V nasadih jablan in hrušk je cvetenje zaključeno (69 – 70 po lestvici BBCH).

Po možnosti za močno primarno okužbo z *jablanovim škrlupom* med 26. in 29. aprilom se je dodatna okužba razvijala tudi med 01. in 03. majem 2021. Izbruhe askospor zabeležimo ob vsakem dežju, zato naj varstvo nasadov sloni na preventivnem pristopu z obnavljanjem fungicidne zaščitne obloge pred predvidenimi padavinami. Obloga je oslABLJENA, ko pade 20 – 25 mm dežja na m². Pri načrtovanju naslednjega tretiranja upoštevajte tudi trenutno intenzivnejši prirast listne mase. Uporabite lahko **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha), oz. **SYLLIT 544 SC** (1,4 l/ha), **AVTAR 75 NT** (2 kg/ha), **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha), **PENNZOZEB 75 DG** (2,5 kg/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha), **ORTHOCLIDE 80 WG** (2 kg/ha), **MERPLUS** (2 l/ha). V kolikor vam ne uspe zaščititi nasada pravočasno, lahko v kombinaciji s prej navedenimi pripravki uporabite: **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **SCALA** (1,125 l/ha), **BATALION 450 SC** (0,7 – 1,0 l/ha) ali **FABAN** (1,2 l/ha; uporabi se lahko brez dodanega dotikalnega sredstva), ki imajo določeno zdravilno delovanje za nazaj. S še daljšim delovanjem za nazaj so na razpolago: **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), ter po zaključenem cvetenju tudi **DIFENZONE** (0,2 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (3,3 l/ha) ali **DOMARK 100 EC** (0,4 l/ha). Za varstvo pred škrlupom lahko uporabite tudi **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in je primerna za ekološko pridelavo.

Višje temperature ozračja in visoka zračna vlaga omogočajo ugodne pogoje za širjenje okužb *jablanove pepelovke*. Na površinah z opaznimi okužbami svetujemo uporabo: **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **STROBY WG** (0,2 kg/ha), **ZATO 50 WG** (100-150 g/ha), **TERCEL** (2,5 kg/ha), **SERCADIS** (0,25 l/ha) ali **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha). Sicer pride v poštev dodajanje sredstev na osnovi žvepla (v trenutnem odmerjanju 5 kg, oz. l/ha).

Preverite ulove *jabolčne grizlice* na **bele lepljive plošče** in v primeru preseženega praga škodljivosti (30 in več osic na ploščo) ukrepajte s pripravkom **MOSPILAN 20 SG** (v 0,04 % konc., oz. 4 g na 10 l vode) ali **NEEMAZAL – T/S** (4,5 l/ha), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. Njegov drugi nanos (prvič pred cvetenjem) je predviden po zaključenem cvetenju. Z navedenima pripravkoma zatirate tudi *listne uši* in *sadnega listnega duplinarja*. Lepljive plošče je potrebno ob zaključenem spremljanju odstraniti, saj se lahko nanje ulovijo tudi koristni organizmi.

V aktualnem obdobju se stopnjuje tudi migracija *krvave uši* v višje predele dreves. V prihajajočem obdobju jo bo ob stabilnejših vremenskih razmerah smotno zatirati s pripravki kot so **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha), **MOVENTO SC 100** (1,9 l/ha), idr. Optimalen pristop proti sesajočim škodljivim organizmom bo podan v naslednjih obvestilih.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.



MKGP-UVHVVR

KGZS-Zavod Novo mesto