
Obvestila za VINOGRADNIŠTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@gov.si

ISSN

št. 04.

Datum: 07. maj 2021

VARSTVO VINSKE TRTE

Razvoj vinske trte je še vedno precej neenakomeren. Sledimo lahko odganjanje brstov in razvoj mladice z razgrnjenima dvema do tremi listi (08-13 po lestvici BBCH).

V trenutnem obdobju nestanovitnega vremena obstaja velika nevarnost okužb s *črno pegavostjo vinske trte*. Za varstvo svetujemo pripravke kot so: **FOLLOW 80 WG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha), **POLYRAM DF** (največji odmerek 3 kg/ha). V poštev pridejo tudi **pripravki na osnovi bakra**: CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha), oz. Predvidena sta dva nanosa; prvič, ko so mladike velike ~ 2 cm in drugič 7 do 10 dni kasneje.

Proti *pršicam trsne kodravosti (akarinoze)* in *trsni pršici (erinoze)* je smotrno uporabiti žveplave pripravke: **THIOVIT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **MICROTHIOL DISPERS**, **PEPELIN WG**, **VINDEX 80 WG**, ki v odmerku 3 do 8 kg/ha dodatno vplivajo na zmanjševanje okužb *črne pegavosti vinske trte* in delujejo proti *oidiji vinske trte*.

Zatiranje fitofagnih pršic je pomembno tudi iz vidika preprečevanja širjenja virusnih obolenj, kot je npr. *Grapevine Pinot gris virus (GPGV)*.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.



MKGP-UHVVR

KGZS-Zavod Novo mesto