

# Obvestilo za SADJARSTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: [domen.bajec@kgzs-zavodnm.si](mailto:domen.bajec@kgzs-zavodnm.si)

ISSN

št. 08

Datum: 04. maj 2022

## VARSTVO KOŠČIČASTIH SADNIH VRST

Nasadi breskev in češenj so zaključili s cvetenjem in razvijajo plodiče (71 – 72 po lestvici BBCH).

Po neurju, ki ga je na območju Posavja in nekaterih predelih Dolenjske spremljala toča, je obvezno opraviti varstvo nasadov pred **glivičnimi obolenji**. Priporočamo sredstva, ki so v tem obdobju predvidena že za redno varstvo pred *listnimi pegavostmi* in *listno luknjičavostjo koščičarjev*: **LUNA EXPERIENCE** (0,6 l/ha; v nasadih češenj in breskev), **SIGNUM** (0,75 kg/ha; v nasadih češenj), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha; v nasadih češenj, breskev in marelic), **SYLLIT 544 SC** (1,4 l/ha; v nasadih češenj), **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha; v nasadih češenj) ali **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; v nasadih češenj, breskev in marelic).

Intenzivne padavine so zelo oslabile delovanje sredstev, ki ste jih uporabili proti prereznožitvam listnih uši. V nasadih češenj v primeru prereznožitve **črne češnjeve uši** (kolonije razvite na več kot 3 % poganjkov) ukrepajte z: **AFINTO** (0,14 kg/ha), **TEPPEKI** (0,14 kg/ha; češnja, višnja, marelica, breskev in nektarina), **MOVENTO SC 100** (1,5 l/ha; le češnje, višnje in slive) ali **NEEMAZAL – T/S** (1,5 l/ha na meter višine krošnje), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. Pripravek **ASSET FIVE** (0,96 l v 1500 l vode) ima dovoljenje za nujne primere prereznožitve listnih uši. V nasadih breskev je najbolj problematična **siva breskova uš** (7 % napadenih poganjkov breskev, 3 % napadenih poganjkov nektarin). Proti njej prideta v poštev še **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha) in **MOSPILAN 20 SG** (0,04 % konc.)

**Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**

## VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Nasadi jablan so na večini leg zaključili s cvetenjem, oblikujejo se plodiči (69 – 71 po lestvici BBCH).

Po neurju, ki ga je na območju Posavja in nekaterih predelih Dolenjske spremljala toča, je obvezno obnoviti zaščitno fungicidno oblogo za varstvo pred **jablanovim škrlupom**. Možnost za močno okužbo je bila nazadnje zabeležena 01.05.2022 (v trajanju 42 ur). Svetujemo uporabo preventivnih fungicidov kot so: **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha),... Če je bila na lokaciji nasada količina padavin večja od 25 l/m<sup>2</sup> in po padavinah še niste opravili ponovnega tretiranja, je potrebno prej navedene pripravke kombinirati s sredstvi, ki imajo poleg preventivnega tudi določeno zdravilno delovanje: **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), **REYONA** (2,34 l/ha), **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **SCALA** (1,125 l/ha), **BATALION** (0,7-1,0 l/ha), **PYRAMID** (1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha). **FABAN** (1,2 l/ha) lahko uporabite samostojno. V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje).

Naslednji nevarnosti za primarne okužbe sta glede na vremensko prognozo nakazani (visoke jakosti) 05.05. in izredne jakosti med 06. in 07. do 08.05.2022.

Pri načrtovanju naslednjega tretiranja upoštevajte tudi potrebo po zaščiti listne površine, ki se razvije z



MKGP-UVHVVR

KGZS-Zavod Novo mesto

intenzivnejšim priraščanje listne mase v obdobju po zaključenem cvetenju.

Pri občutljivih sortah na **jablanovo pepelovko** ('Idared', 'Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',...) svetujemo v tem obdobju **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha), **SERCADIS** (0,25 l/ha), **LUNA CARE** (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **REYONA** (2 l/ha). Možna je tudi raba: **STROBY WG** (0,2 kg/ha), **ZATO** (100-150 g/ha), **TERCEL** (2,5 kg/ha), **TOPAS 100 EC** (0,5 l/ha), **TOPAZE** (0,5 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (3,3 l/ha) ali pripravkov na osnovi **MOČLJIVEGA ŽVEPLA**.

Z zaključkom cvetenja iz nasada pospravite **bele lepljive plošče** za spremljanje naleta **jabolčne grizlice**. Prag škodljivosti je dosežen, ko se ulovi 30 ali več osic na ploščo. Za varstvo pridelka pride v poštev pripravek **MOSPILAN 20 SG** (v 0,04 % konc., oz. 4 g na 10 l vode) ali **NEEMAZAL – T/S** (4,5 l/ha), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. Njegov drugi nanos (prvič pred cvetenjem) je predviden po zaključenem cvetenju. Z navedenima pripravkoma zatirate tudi **listne uši** in **sadnega listnega duplinarja**.

V nasadih z izraženim napadom **jablanove mokaste uši** je potrebno po zaključenem cvetenju ukrepati s **TEPEKKI** (0,14 kg/ha) ali **AFINTO** (0,14 kg/ha).

Proti **krvavi uši** lahko uporabite **MOVENTO SC 100** (1,9 l/ha) ali **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha).

*Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.*

*Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.*

*Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.*

