

# Obvestilo za SADJARSTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: [domen.bajec@kgzs-zavodnm.si](mailto:domen.bajec@kgzs-zavodnm.si)

ISSN

št. 10

Datum: 18. maj 2022

## VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

V nasadih jablan in hrušk se oblikujejo plodiči, ki so večji od 10 mm (71 po lestvici BBCH).

Nedavni možnosti za okužbo z zimskimi sporami *jablanovega škrlupa* sta potekali 13. in 16.05.2022, obakrat v trajanju pogojev 13 ur, kar pomeni zmerno jakost okužbe. Tudi v naprej svetujemo uporabo preventivnih fungicidov kot so: **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **CAPTAN 80 WG** (2 kg/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **MERPLUS** (2 l/ha), **ORTHOVIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha),... V primeru, da je zaščitna obloga fungicida izprana (količina padavin večja od 25 l/m<sup>2</sup>), bo potrebno nanos obnoviti. Pri načrtovanju naslednjega tretiranja upoštevajte tudi intenzivnost prirasta nove listne površine, s čimer naj razmiki v tem obdobju ne bodo daljši od 7 dni. Če takoj po obilnejših padavinah ne uspe opraviti ponovnega tretiranja, je potrebno prej navedene pripravke kombinirati s sredstvi, ki imajo poleg preventivnega tudi določeno zdravilno delovanje: **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), **REYONA** (2,34 l/ha), **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **SCALA** (1,125 l/ha), **BATALION** (0,7-1,0 l/ha), **PYRAMID** (1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha), **FABAN** (1,2 l/ha) lahko uporabite samostojno. V *ekološki pridelavi* uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje).

Pri občutljivih sortah na *jablanovo pepelovko* ('Idared', 'Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',...) svetujemo **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha), **SERCADIS** (0,25 l/ha), **LUNA CARE** (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **REYONA** (2 l/ha). Možna je tudi raba: **STROBY WG** (0,2 kg/ha), **ZATO** (100-150 g/ha), **TERCEL** (2,5 kg/ha), **TOPAS 100 EC** (0,5 l/ha), **TOPAZE** (0,5 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (3,3 l/ha) ali pripravkov na osnovi **MOČLJIVEGA ŽVEPLA**. Okoliščine za razvoj kolonij *listnih uši* so postale z višanjem temperatur ozračja in zračne vlage opazno ugodnejše.

Ob tem smo začeli beležiti tudi migracije *krvavi uši* iz okolice cepljenega mesta v višje predele debla. Prag škodljivosti je pri 5-8 % napadenih vejah, oz. opaženih 12-tih kolonijah na 100 poganjkov. Ko bo dosežen, uporabite **MOVENTO SC 100** (1,9 l/ha) ali **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha).

S hitrejšim segrevanjem ozračja bodo v naslednjih dneh izpolnjeni pogoji za uspešno odlaganje in razvoj jajčec jabolčnega zavijača: <http://agromet.mkgp.gov.si/APP2/sl/Mod/Cydia-pomonella?id=260&soID=14&fenoID=260&insID=0>. Za zatiranje lahko v teh dneh na najtoplejših legah (Šentjernej, Artiče, Metlika) že uporabite pripravka **HARPUN** (1 l/ha) ali **INSEGAR 25 WG** (0,6 kg/ha). Pogoji za uporabo pripravka **CORAGEN** (18 ml/hl) bodo izpolnjeni z začetkom tretje dekade maja.

Pozorno spremljajte pojave *rdeče sadne pršice*, proti kateri boste v primeru prerazmnožitve ukrepali s: **SHIRUDO** (0,5 kg/ha), **MILBEKNOCK** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje), **KANEMITE SC** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje) ali **VERTIMEC PRO** (1,125 l/ha).

*Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.*

*Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrast.*

*Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.*



MKGP-UVHVVR

KGZS-Zavod Novo mesto