

Obvestila za VINOGRADNIŠTVO



Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@gov.si

ISSN

št. 05.

Datum: 18. maj 2022

VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta ima razprtih osem ali več listov in popolnoma razvita socvetja z ločenimi cvetovi (57 po lestvici BBCH).

Možnosti za primarne okužbe s *peronospora vinsko trto* so bile ob dosedanjih okoliščinah na večini območja vinorodne dežele Posavje majhne; prve okužbe so bile omogočene le na Bizeljskem. Razmere se bodo glede na vremensko prognozo spremenile v tretji dekadi maja, s predvidoma pogostejšimi nevihtami. Vinogradnikom svetujemo, da še pred naslednjim dežjem, v prihodnjih dneh obvezno opravite preventivno varstvo. V poštev pridejo sredstva: **DELAN PRO** (3 l/ha), **FOLLOW 80 WG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha), **POLYRAM DF** (največji odmerek 2,4 kg/ha), **MILDICUT** (2 l/ha), **DAIMYO F** (2,5 l/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha), **VINCYA F** (2,5 l/ha), **PERGADO F** (1,25 kg/ha),... Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi aktivne snovi Al- fosetil **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha),... pri katerih je predvidena trikratna zaporedna uporaba.

V primeru *neurja s točo* svetujemo varstvo vinogradov s pripravki na osnovi aktivne snovi folpet (Follow, Folpan, Mikal, Momentum, Pergado F,...).

Proti *oidiju vinske trte* dodate pripravke na osnovi **močljivega, oz. tekočega žvepla**. Na legah, kjer se je v preteklih letih oidij pojavljal obsežneje, lahko uporabite tudi **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,15 l/ha) ali **SPIROX D** (0,5 l/ha).

Opažene pojave *trsne pršice (erinoze)* nadzirajte s pripravkom **VERTIMEC PRO** (1 l/ha, oz. 10 ml/100 m²). Vinogradnikom svetujemo še spremljanje prisotnosti *gosenic grozdnih sukačev* na kabrnikih. V primeru prereznožitve zaščitite pridelek s pripravkom **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha),...

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

