

Obvestila za VINOGRADNIŠTVO



Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@gov.si

ISSN

št. 09.

Datum: 10. junij 2022

VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta cveti (65 po lestvici BBCH).

Vremenske razmere so v trenutnem obdobju pogostih padavin zelo ugodne za razvoj glivičnih obolenj. Za varstvo pred *peronosporo vinske trto* svetujemo sredstva s kombiniranim načinom delovanja: **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), ali **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha), **MAGNA TRIPLE WG** (3 kg/ha), pri katerih je predvidena trikratna zaporedna uporaba; oz. druge kombinirane pripravke kot so: **REBOOT** (0,4 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **TWINGO** (3 kg/ha), **CYMBAL** (0,25 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **FOLPAN GOLD** (2 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXSTRA WDG** (1,5 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **VALIS F** (2 kg/ha), **SANVINO** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (3 l/ha), **PERGADO F** (1,25 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **ORONDIS** (0,32 l/ha), **ZORVEC ZELAVIN** (0,6 l/ha), **DAIMYO F** (2,5 l/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha), **VINCYA F** (2,5 l/ha), **MILDICUT** (2 l/ha), **DELAN PRO** (3 l/ha), **FOSHIELD** (v kombinaciji z drugimi dotikalnimi fungicidi, po navodilu za uporabo),

Proti *oidiji vinske trte* priporočamo: **DYNALI** (0,65 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 – 0,6 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **KUSABI 300 SC** (v času cvetenja 0,25 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (do nastavka plodiča 0,375 l/ha), **LUNA MAX** (1 l/ha), **COLLIS** (0,4 l/ha),... Na ostalih površinah lahko še vedno dodate le **PRIPRAVKE NA OSNOVI MOČLJIVEGA**, oz. **TEKOČEGA ŽVEPLA**.

V primeru *neurja s točo* je potrebno najprej počakati, da se vinograd osuši, potem uporabite pripravke **na osnovi aktivne snovi folpet** (Follow 80 WG, Folpan 80 WDG, Mikal Flash, Momentum F, Pergado F, Twingo,...) ali bakra.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

